

HASAT

Ülkemizde fiğ yetiştiriciliği genellikle ot amacıyla yapılmaktadır. Fiğ bitkisinin hasat zamanı karışık veya yalnız ekim durumuna göre ayarlanır. Fiğ biçimi karışık ekimlerde hububat durumuna göre ayarlanır. Eğer fiğ yalnız ekilmişse biçim alt baklaların olduğu dönemde yapılmalıdır. Karışık olarak ekilen fiğlerde biçim tahılların süt olum döneminde yapılmalıdır. Fiğ bitkisinin yeşil ot verimi **1.500–3.000 kg/da** olup, buda **500–700 kg/da** kuru ota tekabül etmektedir. Fiğ otu yaklaşık % **12–20** oranında ham protein içerir. Hasat sonrası bitkiler ya silaj yapılır ya da tarla yüzeyinde kurumaya bırakılır ve belli aralıklarla ters çevirme işlemi uygulanır. Aşırı kurutulması yaprak dökülmesine neden olduğundan ürün kaybı ortaya çıkar.



Fiğ+Tahıl Karışımları Silajı

Silaj amacıyla en fazla yulaf, arpa, tritikale ve buğday kullanılmaktadır. Karışım hasadı tahıllar süt olum döneminde iken veya fiğ hasadı ise bakla doldurma döneminde yapılmalıdır. Bu nedenle kaliteli ot üretimi için **fiğin tahıllarla karışık** olarak ekilmesi önerilir. Bu ekim şeklinde biçim daha kolay olacağı gibi, otun verim ve kalitesi de artmaktadır. Fiğ silajının içine 1 tona 15-20 kg ucuz tahıl danesi konulması gerekir.

TARIMSAL DESTEKLEMELER

Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemine bağlı olarak verilen tüm desteklerde 3 yıl üst üste aynı bitkinin yetiştirilmesi durumunda desteklemenin iptal olacağını bildirmiştir.

Bu nedenle sürekli aynı ürünü yetiştirmek zorunda kalan üreticilerin en azından kış döneminde kısa sürede yetişebilen yem bitkilerinin üretilmesi yerinde olacaktır.

Bakanlığımızca yem bitkilerine verilen destekler şöyledir.

Yem Bitkileri Desteği	TL/da/yıl
Çok Yıllıklar	90
Tek Yıllıklar	60
Silajlık Mısır	100
Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri	40



AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Adnan Menderes Mh. Yahya Kemal Caddesi.
No:2 09010 Efeler/AYDIN
Telefon : 0256 211 30 00
Faks : 0256 211 30 10
İnternet: <https://aydin.tarimorman.gov.tr/>



T.C. AYDIN VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ



Adi Fiğ



Tüylü Fiğ



Macar Fiği

FIĞ TARIMI

2018 • AYDIN

ÖNEMİ

Fiğ bitkisi anavatanı Akdeniz, Asya ve Avrupa ülkeleri olan, bulunan geniş adaptasyon yeteneğine sahip tek yıllık baklagiller ailesinden yem bitkisidir.

Fiğ bitkisinin, ot verimi yüksek olup elde edilen otun besin değeri iyi olduğu gibi tohumunun yüksek oranda protein içermesi nedeniyle **kesif yem** olarak kullanılmaktadır. Fiğ bitkisinden elde edilen ot hayvanlarda şişmeye neden olmaz. Çiçeklenme dönemi başlangıcında biçilen fiğ kuru otunda yaklaşık olarak **%12–20 ham protein, %6–10 ham kül, %25–26 ham selüloz ve %45–46 azotsuz öz madde** bulunur.

Ülkemizde ise, fiğ bitkisi yeşil veya kuru ot elde etmek, tane yem elde etmek, yeşil gübre bitkisi olarak, mera bitkisi olarak ve silajlık bitki olarak kullanılır. Çok sayıda türü olan fiğin Bölgemizde uygun olan türü **adi fiğ** olup serin yerlerde ise tüylü fiğ veya macar fiğinin kullanılması yerinde olur.

Baklagiller ailesinden olan fiğin köklerinde bulunan yumrular ile toprağa **5–10 kg/da azot, 400 kg/da organik madde** bağladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sürekli pamuk ekilen alanlarda kış döneminde ot için fiğ yetiştirilmesi veya toprağa gömülerek yeşil gübre yapılması uygun olacaktır.

YETİŞTİRİLMESİ

Ülkemizde en fazla yetiştirilen fiğ türü olan adi fiğ kurak şartlara oldukça dayanıklıdır. Yöremizde sonbaharda ekilmesi önerilir, ancak kar yağın yaylalarda önce-likle tüylü fiğın ekilmesi, yoksa adi fiğın ilkbaharda ekilmesi tavsiye edilir.

Fiğ türleri toprak bakımından çok seçici değildir. Adi fiğ türü hemen her türlü toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir. Eğer buğday ve pamuktan sonra fiğ ekimi yapılacaksa toprakta kalan anız ve saplar diskaro ile parçalanıp toprağa gömül-melidir.



Fiğ türleri genellikle yatmaya meyilli olduklarından hasat sırasında çürüme ile kayba neden olan bitkilerdir. **Fiğ bitkisinde yatmayı engellemek amacıyla hububatlar ile karışık ekim yapılması tavsiye edilir.** Yatan fiğ zor biçildiği gibi bitkilerin alt kısımlarında çürümeler başlar. Karışık ekimde arpa, buğday ve yulaf gibi bitkiler % 40–60 oranında olmalı ve % 60–80 adi fiğ kullanılarak karışık ekim yapılmalıdır.

Serpme ekim yönteminde sade fiğ ekilecekse dekara yaklaşık **15 kg fiğ tohumu** atılmalıdır. Serpme ekimde, ekim derinliği yaklaşık **3–4 cm** olmalıdır.

Karışık ekimde **6–10 kg/da** fiğ tohumuna karşılık **4–6 kg/da** buğdaygil (arpa, yulaf, tritikale) tohumu kullanılması tavsiye edilir.

Mibzerle fiğ ekiminde dekara atılacak tohum miktarı yaklaşık **10–12 kg** olarak olmalıdır. Ekimde sıra aralığı **15–20 cm** olmalıdır. Ekim derinliği toprağın yapısına göre değişiklik gösterir.



Köklerinde azot bağlayan yumrular bulunan Adi fiğın yetiştiriciliğinde kendinden önce pamuk gibi bir endüstri bitkisi geldiği zaman genellikle gübre uygulanmaz. Ancak iyi verim almak için ekimden önce hızlı gelişim sağlaması için dekara 2–3 kg amonyum sülfat gübresi ve çıkıştan sonra dekara 6–7 kg saf fosfor verilmelidir.