

TRİTİKALE TARIMI

Tritikale buğday ile çavdar melezlemesi sonucu oluşmuştur.

Amaç, çavdarın kötü koşullara dayanıklılığı ile buğdayın verim potansiyeli ve kalitesini birleştirmektir.

Dane kalitesindeki iyileşme sonucu un olarak da kullanılmaktadır.

Hayvan yemi olarak değerlendirilebilir.

Kuru ot verimi yüksek olup, daha uzun süre saklanabilmekte ve süt sığırlarına silaj olarak yedirilebilmektedir.



- Hayvan yemi olarak değerlendirilebilir.
- Dane kalitesindeki iyileşme sonucu un olarak da kullanılmaktadır.

- Kuru ot verimi yüksek olup, daha uzun süre saklanabilmekte ve süt sığırlarına silaj olarak yedirilebilmektedir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ

- Tritikale serin iklim bitkisi ve her tür toprak koşulunda yetişir.
- Taşlı, derinliği az, meyilli, çorak, asitli topraklara dayanıklı olup; özellikle kırıç koşullarda buğdaya ve arpaya göre daha verimli olmaktadır.
- Özellikle kırıç koşullarda buğdaya ve arpaya göre daha verimli olmaktadır.

TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİM

- Derin sürüm yapıldıktan sonra 10 – 12 cm derinlikte yüzeysel işlenmiş bir tohum yatağı hazırlanır. Gerekirse tarla yüzeyi tırmık yardımıyla düzgün hale getirilir.

GÜBRELEME

- Azotlu gübrelerin tritikale üretiminde ideal uygulanması üçe bölünerek yapılır.
- Kuru koşullarda 12 kg/da, sulu koşullarda 14 kg/da saf azot yeterli olmaktadır. Fosforlu gübrelerin ekimden önce toprağa verilmesi, bitkiler tarafından ileri ki gelişme dönemlerinde kolay ve yeterli alınmasını sağlar.



SULAMA

- Sulama halinde bir miktar gübrenin geç döneme bırakılması (mart sonu) kaliteli dane elde etmede faydalı olur.
- Su verilecek alanlarda suyun mümkünse sapa kalkma döneminde verilmesi uygun olur.
- Fazla sulama bu çeşitte yatma problemlerine sebep olabilir. Dane dökme problemi olmadığı için hasat kaybı düşüktür.

YABANCI OT MÜCADELESİ

- Tritikale tarımında yabancı ot mücadelesi aynı buğday tarımında olduğu gibi kültürel tedbirlerle ve kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır.
- Kimyasal yol ile yabancı ot kontrolünde tarlada bulunan yabancı ot türüne göre seçilecek herbisitler, ekim sonrası veya çıkış sonrası ilkbaharda otların 2–4 yaprak devresinde iken kullanılabilir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

- Tritikale hastalıkları arasında en önemlileri kara pas ve sarı pas hastalıklarıdır. Önemli zararlıları ise buğday ve çavdarda görülen (Süne, Ekin Kambur Böceği vb.) zararlılardır. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele buğday ve çavdarda olduğu gibi yapılmaktadır.

HASAT VE DEPOLAMA

- Tritikalenin dane için hasadı, normal buğday hasadı için ayarlı biçerdöver ile yapılabilir. Bitkiler hasat olumuna geldiğinde gündüzleri sabah çiğ kalkınca sonra buğday gibi normal yükseklikten hasadı yapılır.



AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Adnan Menderes Mh. Yahya Kemal Caddesi.
No:2 09010 Efeler/AYDIN
Telefon : 0256 211 30 00
Faks : 0256 211 30 10
İnternet: <https://aydin.tarimorman.gov.tr/>

2018 • AYDIN